

ポリコナゾール錠50mg/100mg/200mg「JG」

服用される患者さまへ

この薬は真菌（カビの一種）による感染症（真菌感染症）を治療するお薬です。

- 食事の影響を受けるので、**食間**（食事と食事の間、食事の約2時間後が目安）に服用してください。
- この薬は体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を減らしたりすると真菌感染症が再発するおそれがあります。**指示どおりに飲み続けることが重要です。**

【眼の異常】

服用中に以下のような症状も含め眼の異常があらわれ、薬を中止した後も症状が持続することがあります。この薬を服用中及び服用中止した後もこれらの症状が回復するまでは、**自動車の運転等の危険を伴う機械操作は行わないでください。**また、必要に応じて眼科を受診してください。

- ◇ 眼がまぶしく感じる（羞明：しゅうめい）
- ◇ 眼がかすむ、眼に霧がかかったような感じになる（霧視：むし）
- ◇ 眼が見えにくい（視覚異常：しかくいじょう）
- ◇ 景色の色が変化する（色覚異常：しきかくいじょう）
- ◇ 物が二重に（二つに）見える（複視：ふくし）

【肝機能障害】

重篤な肝障害があらわれることがありますので、この薬を服用中は**定期的**に**肝機能検査等が行われます。**以下のような症状があらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。

- ◇ からだがだるい
- ◇ 白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる
- ◇ 嘔吐（おうと）、吐き気
- ◇ 食欲不振
- ◇ かゆみ
- ◇ 尿の色が濃くなる

他にも注意して頂きたい副作用がありますので、服用中に以下の症状があらわれたらすぐに医師、薬剤師にご連絡ください。

- ◇ 顔面蒼白、冷や汗、呼吸困難
- ◇ 赤い発疹、結膜・唇・口内のただれ、口内炎、眼の充血、発熱
- ◇ 胸の痛み、動悸、めまい
- ◇ 全身のむくみ、息切れ
- ◇ 尿量が減る
- ◇ 頭痛
- ◇ あざができる、出血しやすい

上記以外にも気になる症状がありましたら、医師、薬剤師にご相談ください。

【その他生活上の注意】

- **光線過敏性反応（光にあたった部分が赤くなるなど）**があらわれることがありますので、服用中は長袖の衣服、帽子などの着用により日光の照射を避け、日焼け止め効果の高いサンスクリーンの使用により**紫外線の照射を避けてください**。なお、服用後も当分の間は、同様にご注意ください。
- **セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品**は、薬の作用に影響しますので、控えてください。
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

連絡先