

アジスロマイシン錠250mg「JG」

を服用される方へ

このお薬について

アジスロマイシン錠は、クラミジア・トラコマティスという菌による感染症を治療するお薬です。

※他の感染症を治療する目的で処方される場合もあります。

**1回4錠の服用で
約10日間効果が続きます。**

処方されたお薬を、すべて1度に飲んでください。このお薬は食事による影響を受けませんので、食後まで服用を待つ必要がありません。すぐに飲んでいただけます。

お薬を正しく飲んで頂くために

- ◇ 医師・薬剤師の指示を守って服用してください。決して他人に譲渡しないでください。
- ◇ 重複投与を避けるため、複数の医療機関で診療を受ける方は、アジスロマイシン錠を服用していることを伝えてください。
- ◇ 次の場合には、このお薬を処方された医師、薬剤師に相談してください。
 - * 1週間たっても症状の改善が見られない場合。
 - * 服用後に、不快な症状があらわれた場合。
 - * 服用後すぐにじんましん、むくみ等とともに、顔色が青白くなる、手足が冷たくなる、冷や汗あるいは息苦しさ等があらわれた場合。
 - * 高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等が、全身の皮ふ及びくちびるや眼等の粘膜にあらわれた場合。
- ◇ このお薬について分からないことがありましたら、医師・薬剤師にお尋ねください。