

## 「使用上の注意」の改訂に関するお知らせ

2020年2月-3月

免疫抑制剤

**シクロスポリン** カプセル10mg「BMD」

**シクロスポリン** カプセル25mg「BMD」

**シクロスポリン** カプセル50mg「BMD」

CICLOSPORIN

シクロスポリン製剤



このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。ご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

また、今後とも弊社製品のご使用に当たって、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社MRまでできるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（抜粋）

（改訂箇所：\_\_\_\_\_部）

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3.相互作用 〈変更なし〉 (1)併用禁忌(併用しないこと) 〈変更なし〉 (2)併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3.相互作用 〈省略〉 (1)併用禁忌(併用しないこと) 〈省略〉 (2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
〈変更なし〉			〈省略〉		
ドセタキセル パクリタキセル	本剤又はこれらの薬剤の血中濃度が上昇する可能性があるため、併用する場合には血中濃度を参考に投与量を調節すること。	代謝酵素を競合することにより、本剤又はこれらの薬剤の代謝が阻害される可能性がある。	ドセタキセル パクリタキセル	本剤又はこれらの薬剤の血中濃度が上昇する可能性があるため、併用する場合には血中濃度を参考に投与量を調節すること。	代謝酵素を競合することにより、本剤又はこれらの薬剤の代謝が阻害される可能性がある。
レテルモビル		レテルモビルのCYP3A阻害により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。また、本剤の有機アニオントランスポーター阻害によりレテルモビルの血中濃度が上昇する可能性がある。	エゼチミブ		機序は不明である。
エゼチミブ		機序は不明である。	〈省略〉		
〈変更なし〉					

(2020年2月改訂)

### 2. 改訂理由

次のとおり、自主改訂いたしました。

- ・ 相互作用相手薬との整合のため、「併用注意」の項に「レテルモビル」を追加いたしました。

### 3. DSU掲載

使用上の注意改訂情報は、2020年3月発行予定の「医薬品安全対策情報（DSU）No.287」に掲載されます。

今回の使用上の注意改訂等を反映した添付文書情報につきましては、以下のホームページよりご確認ください。

- ・ 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・ 日本ジェネリック株式会社 医療関係者さま向けページ (<http://www.nihon-generic.co.jp/medical/>)

お問合せ先：日本ジェネリック株式会社  
安全管理部 TEL：03-6810-0502