

一般名:ダサチニブ

	自 社 製 品	類 似 薬
	ダサチニブ錠 20mg・50mg「JG」	スプリセル錠 20mg・50mg
効 能 ・ 効 果	再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性 急性リンパ性白血病	1. 慢性骨髄性白血病 2. 再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性 急性リンパ性白血病
用 法 ・ 用 量	通常、成人にはダサチニブとして1回70mgを1日2回経 口投与する。 なお、患者の状態により適宜増減するが、1回90mgを1 日2回まで増量できる。	1. 慢性骨髄性白血病 (1) 慢性期 通常、成人にはダサチニブとして1日1回100mgを経口 投与する。 なお、患者の状態により適宜増減するが、1日1回 140mgまで増量できる。 (2) 移行期又は急性期 通常、成人にはダサチニブとして1回70mgを1日2回経 口投与する。 なお、患者の状態により適宜増減するが、1回90mgを1 日2回まで増量できる。 2. 再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性 急性リンパ性白血病 通常、成人にはダサチニブとして1回70mgを1日2回経 口投与する。 なお、患者の状態により適宜増減するが、1回90mgを1 日2回まで増量できる。