

「使用上の注意」の改訂に関するお知らせ

2026年4月-5月

深在性真菌症治療剤
日本薬局方 フルコナゾールカプセル

フルコナゾールカプセル50mg「JG」 フルコナゾールカプセル100mg「JG」

Fluconazole Capsules

製造販売元 日本ジェネリック株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、「使用上の注意」の一部を改訂いたしました。ご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

また、今後とも弊社製品のご使用に当たって、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社までできるだけ速やかにご連絡くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

1. 改訂内容

- 以下のとおり自主改訂いたしました。
 - ✓ 相互作用相手薬記載との整合のため、「併用注意」の項に「リメゲパント」及び「エトラシモド」を追記いたしました。
 - ✓ 「重大な副作用」の項の「血管浮腫」を「血管性浮腫」に記載整備いたしました。

2. DSU掲載

使用上の注意改訂情報は、2026年5月発行の「医薬品安全対策情報（DSU）No.345」に掲載されます。

今回の使用上の注意改訂等を反映した電子化された添付文書情報につきましては、以下よりご確認ください。

- 日本ジェネリック株式会社 医療関係者向けサイト (<https://medical.nihon-generic.co.jp/>)
- 医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- 「添文ナビ[®]」にて個装箱等に表示のGS1バーコードを読み取る。
「添文ナビ[®]」のインストールや使用方法は日薬連のホームページをご覧ください。
(<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/>)

お問合せ先：日本ジェネリック株式会社
安全管理部 TEL：03-6684-2467

フルコナゾールカプセル「JG」



J20260001

3. 改訂箇所(抜粋)

(改訂箇所： _____ 部)

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10. 相互作用 10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
〈変更なし〉			〈省略〉		
トルバブタン	〈変更なし〉	〈変更なし〉	トルバブタン	〈省略〉	〈省略〉
リメゲパント	リメゲパントのAUC上昇の報告があり、リメゲパントの副作用が増強されるおそれがある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。		〈省略〉	〈省略〉
〈変更なし〉			〈省略〉		
シクロホスファミド	〈変更なし〉	〈変更なし〉	シクロホスファミド	〈省略〉	〈省略〉
エトラシモド	エトラシモドのAUCが84%増加したとの報告がある。	本剤はエトラシモドの主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C9を阻害するので、併用によりエトラシモドの血中濃度が上昇することがある。		〈省略〉	〈省略〉
〈変更なし〉			〈省略〉		
11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック (頻度不明)、アナフィラキシー (頻度不明) ショック、アナフィラキシー (血管性浮腫、顔面浮腫、そう痒等) を起こすことがある。 [8.3、9.1.1 参照]			11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック (頻度不明)、アナフィラキシー (頻度不明) ショック、アナフィラキシー (血管浮腫、顔面浮腫、そう痒等) を起こすことがある。 [8.3、9.1.1 参照]		
11.1.2-11.1.12 〈変更なし〉			11.1.2-11.1.12 〈省略〉		

(2026年4月改訂)