

前立腺癌治療剤

フルタミド錠

貯法：室温保存
有効期間：3年劇薬、処方箋医薬品^注フルタミド錠125mg[VTRS]
FLUTAMIDE Tablets

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

承認番号	22600AMX00185
販売開始	2010年1月

1. 警告

1.1 劇症肝炎等の重篤な肝障害による死亡例が報告されているので、定期的（少なくとも1ヵ月に1回）に肝機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。[8.、11.1.1参照]

1.2 AST、ALT、LDH、Al-P、 γ -GTP、ビリルビンの上昇等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.、11.1.1参照]

1.3 副作用として肝障害が発生する可能性があることをあらかじめ患者に説明するとともに、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、そう痒、発疹、黄疸等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、直ちに受診するよう患者を指導すること。[8.、11.1.1参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 肝障害のある患者 [9.3参照]




2.2 本剤に対する過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	フルタミド錠125mg [VTRS]
有効成分	1錠中 日局 フルタミド 125.0mg
添加剤	結晶セルロース、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アルファー化デンプン、ラウリル硫酸ナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

3.2 製剤の性状

販売名	外形			識別コード	色調等
	上面	下面	側面		
フルタミド錠 125mg [VTRS]				MH271	淡黄色素錠
	直径 8.5mm	厚さ 3.9mm	重量 250mg		

4. 効能又は効果

前立腺癌

6. 用法及び用量

通常成人にはフルタミドとして1回125mgを1日3回、食後に経口投与する。なお、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

重篤な肝障害があらわれることがあるので、定期的（少なくとも1ヵ月に1回）に肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。[1.1-1.3、11.1.1参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある患者

9.3 肝機能障害患者

肝障害のある患者には投与しないこと。重篤な肝障害に至るおそれがある。[2.1参照]

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら用量に留意して慎重に投与すること。本剤の臨床試験成績から、高齢者と非高齢者において副作用の発現率及びその程度に差がみられていないが、本剤は主として肝臓で代謝されており、高齢者では肝機能等の生理機能が低下していることが多く高い血中濃度が持続するおそれがある。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン	ワルファリンの抗凝固作用を増強するとの報告がある。	機序不明

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 重篤な肝障害（頻度不明）

劇症肝炎等の重篤な肝障害（初期症状：食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、そう痒、発疹、黄疸等）があらわれることがある。[1.1-1.3、8.参照]

11.1.2 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.3 心不全、心筋梗塞（頻度不明）

11.2 その他の副作用

	10%以上	1～10%未満	1%未満	頻度不明
肝臓	AST上昇、ALT上昇	γ -GTP上昇、Al-P上昇	LDH上昇	ビリルビン上昇
内分泌系	女性型乳房(22.2%)	ポテンツ低下		
消化器		悪心・嘔吐、下痢	食欲不振	胸やけ、胃痛、胃部不快感、口渇
血液			白血球減少	貧血、血小板減少
腎臓			BUN上昇、尿蛋白陽性	クレアチニン上昇
精神神経系			めまい	ふらつき、立ちくらみ、頭痛、脱力感、傾眠、不眠、混乱、うつ状態、不安感、神経過敏症
過敏症				発疹、光線過敏症
皮膚				そう痒
その他			尿糖陽性、血清総蛋白減少	浮腫、全身倦怠感、発熱、潮紅、発汗、味覚障害、血糖値上昇

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

本剤の投与により尿が琥珀色又は黄緑色を呈することがある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

前立腺癌患者にフルタミド125mgを単回経口投与したとき、フルタミドは速やかに吸収され、ほとんどは活性代謝物OH-フルタミドとして血中に存在した。OH-フルタミドは投与後2時間で最高濃度に達した後、半減期13.9時間で消失した。フルタミド30～500mgを単回経口投与したとき、OH-フルタミドのC_{max}及びAUCは、投与量に依存した線形性が認められた¹⁾。

16.1.2 反復投与

前立腺癌患者にフルタミド125mgを1日3回、14日間反復投与したとき、OH-フルタミドは2~4日目以降で定常状態に達した¹⁾。

16.1.3 生物学的同等性試験


フルタミド錠125mg「VTRS」とオダイン錠125mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(フルタミドとして125mg)健康成人男子に絶食時単回経口投与して血漿中ヒドロキシフルタミド(活性代謝物)濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C_{max})について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された²⁾。

血漿中ヒドロキシフルタミド(活性代謝物)の薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _t (ng・hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
フルタミド錠125mg「VTRS」	3249.31±1422.17	422.27±141.48	3.15±0.92	4.89±1.77
オダイン錠125mg	3044.16±1043.88	409.07±106.32	2.70±1.02	5.12±1.55

(平均値±標準偏差、n=20)

血漿中ヒドロキシフルタミド(活性代謝物)の濃度推移



血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.3 分布

ヒト血漿に¹⁴C-フルタミドを200ng/mL添加したときの血漿蛋白結合率は99.1%であり、OH-フルタミドを1000ng/mL添加したときの血漿蛋白結合率は93.6%であった¹⁾。

16.4 代謝

前立腺癌患者の血漿中にはOH-フルタミド及び未変化体が認められ、血中主代謝物はOH-フルタミドであった。尿中代謝物は、ほとんどがグルクロン酸抱合体の形で存在した¹⁾。

16.5 排泄

ヒトにおける主排泄経路は尿と考えられるが、排泄率は8.6~84.0%と個体差が大きかった¹⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内前期第Ⅱ相試験(用量設定試験)

内分泌療法未治療の前立腺癌患者を対象とした用量設定試験の結果、フルタミド錠375mg/日投与における奏効率は48.8%(20/41例)であった³⁾。副作用発現頻度は26.2%(17/65例)であり、主な副作用は女性型乳房21.5%(14/65例)、ボテツ低下6.2%(4/65例)、悪心・嘔吐3.1%(2/65例)であった。臨床検査値異常は20.0%(13/65例)であり、主な臨床検査値異常はAST上昇12.3%(8/65例)、ALT上昇10.8%(7/65例)、γ-GTP上昇6.2%(4/65例)であった³⁾。

17.1.2 国内後期第Ⅱ相試験(二重盲検比較試験)

未治療の前立腺癌患者を対象とした二重盲検比較試験の結果、フルタミド錠375mg/日投与における奏効率は48.9%(23/47例)であった⁴⁾。副作用発現頻度は21.2%(11/52例)であり、主な副作用は女性型乳房15.4%(8/52例)であった。主な臨床検査値異常はAST上昇、ALT上昇7/52(13.5%)であった⁴⁾。

17.2 製造販売後調査等

17.2.1 国内市販後第Ⅲ相臨床試験

未治療の進行前立腺癌(臨床病期D)患者を対象としたフルタミド錠(375mg/日投与又は250mg/日投与^{3b)})とLH-RHアゴニストとの併用投与群とLH-RHアゴニスト単独投与群の無作為化比較試験の結果は以下のとおりであった³⁾。

評価項目	薬剤投与群 フルタミド錠とLH-RHアゴニストとの併用投与群	LH-RHアゴニスト単独投与群	検定結果
全生存期間 中央値	(107例) 1841日	(53例) 1530日	Log-Rank P=0.2053
抗腫瘍効果(総合判定) 奏効率	70.1%(75/107例)	49.1%(26/53例)	χ ² 検定 P=0.0094
安全性(副作用発現症例率) 自覚症状・他覚所見 臨床検査値異常	42.2%(46/109例) 60.6%(66/109例)	30.2%(16/53例) 52.8%(28/53例)	χ ² 検定 P=0.1400 P=0.3502

なお、フルタミド錠375mg/日投与と250mg/日投与^{3b)}の間には、無増悪生存期間 中央値、抗腫瘍効果において差はなかった。

(注) 本剤の承認された用法及び用量は「通常成人にはフルタミドとして1回125mgを1日3回、食後に経口投与する。なお、症状により適宜増減する」である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

OH-フルタミドが前立腺癌組織のアンドロゲンレセプターに対するアンドロゲンの結合を阻害することにより、抗腫瘍効果を発揮するものと考えられる⁶⁾。

18.2 アンドロゲンレセプターとの結合能(in vitro)

ラット前立腺癌細胞(R3327-G)中のアンドロゲンレセプターを用いた試験において、フルタミドの主活性代謝物であるOH-フルタミドはジヒドロテストステロンの約200倍の濃度で合成アンドロゲン剤のアンドロゲンレセプターに対する結合を50%阻害した⁶⁾。

18.3 抗腫瘍効果(in vivo)

フルタミドはスードマウスに移植したアンドロゲン依存性ヒト前立腺癌細胞(HONDA)及びラット前立腺癌細胞(R3327-G)の増殖を抑制した⁷⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称: フルタミド(Flutamide)

化学名: 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide


分子式: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃

分子量: 276.21

性状: 淡黄色の結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール(95)に溶けやすく、水にほとんど溶けない。

化学構造式:



融点: 109~113°C

22. 包装

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

23. 主要文献

- 1) 浅川紀子ほか: 化学療法の領域. 1995; 11 (7): 1418-1427
- 2) 社内資料: 生物学的同等性試験(フルタミド錠125mg「VTRS」)
- 3) 阿曾佳郎ほか: 泌尿紀要. 1993; 39: 391-403
- 4) Akaza H, et al.: Jpn J Clin Oncol. 1993; 23: 178-185
- 5) Kanetake H, et al.: Jpn J Cancer Chemother. 2014; 41: 2591-2597
- 6) 黒岩俊介ほか: 基礎と臨床. 1995; 29: 877-885
- 7) 黒岩俊介ほか: 基礎と臨床. 1995; 29: 887-897

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室
〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

26. 製造販売業者等

* 26.1 製造販売元

ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社
東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

26.2 販売元

JG 日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号