

**ラモトリギン錠/錠小児用「JG」**  
**てんかん患者（小児）への使用に関するお願い**

ラモトリギン製剤の小児てんかん患者への用法及び用量につきましては、『ラモトリギン錠小児用2mg/小児用5mg「JG」』だけでなく、『ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」』も販売しております。小児てんかん患者に処方する場合、服用錠数が多くなることにより患者様の服用のご負担とならないよう、用量にあわせて『ラモトリギン錠25mg/100mg「JG」』の処方をご検討いただくようお願い申し上げます。

**<小児てんかん患者における単剤療法(定型欠神発作に用いる場合)の維持用量処方例>**

小児てんかん患者の単剤療法（定型欠神発作に用いる場合）の維持用量として、1日1回100mgを投与する場合、錠小児用5mg「JG」を20錠処方するのではなく、錠25mg「JG」を4錠処方する等のご配慮をお願い申し上げます。

(例：ラモトリギン100mg処方時の服用錠数)

	ラモトリギン錠 小児用2mg「JG」	ラモトリギン錠 小児用5mg「JG」	ラモトリギン錠 25mg「JG」	ラモトリギン錠 100mg「JG」
服用錠数	50錠	20錠	4錠	1錠

**<電子添文『6.用法及び用量』より一部抜粋>\***

**6.用法及び用量**

○てんかん患者に用いる場合













小児(錠小児用2mg、錠小児用5mg、錠25mg、錠100mg)

(1)単剤療法の場合(定型欠神発作に用いる場合)

通常、ラモトリギンとして最初の2週間は1日0.3mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与し、次の2週間は1日0.6mg/kgを1日1回又は2回に分割して経口投与する、その後は、1～2週間毎に1日量として最大0.6mg/kgずつ漸増する。維持用量は1日1～10mg/kgとし、1日1回又は2回に分割して経口投与する。症状に応じて適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日量として最大0.6mg/kgずつ、1日用量は最大200mgまでとし、いずれも1日1回又は2回に分割して経口投与する。

\* その他の効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報は電子添文をご参照ください。発作型や併用薬に応じて用法及び用量が設定されています。用法及び用量の遵守をお願いいたします。

**<参考>**

販売名	外形・大きさ・重量			販売名	外形・大きさ・重量		
ラモトリギン錠 小児用2mg「JG」	  			ラモトリギン錠 25mg「JG」	  		
	直径 4.8mm	厚さ 1.6mm	重量 45mg		直径 5.3mm	厚さ 2.0mm	重量 63mg
ラモトリギン錠 小児用5mg「JG」	  			ラモトリギン錠 100mg「JG」	  		
	長径 8.0mm	短径 4.0mm	厚さ 2.6mm		重量 103mg	直径 8.4mm	厚さ 3.2mm

お問合せ先：日本ジェネリック株式会社 安全管理部

TEL：03-6684-2467

※電子化された添付文書は、添付文書閲覧アプリ「添付ナビ®」にてご覧ください。



J20260007