

「使用上の注意」の改訂に関するお知らせ

2026年3月

抗リウマチ剤 メトトレキサート錠 メトトレキサート錠2mg「JG」 Methotrexate Tablets

製造販売元 日本ジェネリック株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、「使用上の注意」の一部を改訂いたしました。ご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

また、今後とも弊社製品のご使用に当たって、副作用等の治療上好ましくない事象をご経験の際には、弊社までできるだけ速やかにご連絡くださいますよう、併せてお願い申し上げます。

1. 改訂内容

- 以下のとおり自主改訂いたしました。
 - ✓ 同一成分薬での CCDS（企業中核データシート）の改訂に伴い、「重要な基本的注意」の項に「光線過敏症」に関する注意を記載いたしました。
また、「併用注意」の項に「タラボルフィンナトリウム」を追記いたしました。
 - ✓ 相互作用相手薬の製造販売中止のため、「ポリフィマーナトリウム」を削除いたしました。

2. 改訂箇所(抜粋)

(改訂箇所：_____部、削除箇所：_____)

改訂後			改訂前		
8. 重要な基本的注意			8. 重要な基本的注意		
8.1-8.12 <変更なし>			8.1-8.12 <省略>		
8.13 光線過敏症が報告されているので、適切な日焼け防止対策を行い、強い日光又は紫外線への曝露を避けるよう患者に指導すること。[10.2参照]					
8.14-8.17 <変更なし：変更前の8.13-8.16>			8.13-8.16 <省略>		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<変更なし>			<省略>		
タラボルフィンナトリウム [8.13 参照]	光線過敏症を起こすことがある。	併用薬剤が光感受性を高めるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。	ポリフィマーナトリウム	光線過敏症を起こすことがある。	ポリフィマーナトリウムは光感受性を高める作用があるため、光線過敏症を起こしやすい薬剤の作用を増強する。

(2026年3月改訂)

3. DSU掲載

使用上の注意改訂情報は、2026年4月発行の「医薬品安全対策情報（DSU）No.344」に掲載されます。

今回の使用上の注意改訂等を反映した電子化された添付文書情報につきましては、以下よりご確認ください。

- ・日本ジェネリック株式会社 医療関係者向けサイト (<https://medical.nihon-generic.co.jp/>)
- ・医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・「添文ナビ[®]」にて個装箱等に表示のGS1バーコードを読み取る。
「添文ナビ[®]」のインストールや使用方法は日薬連のホームページをご覧ください。
(<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/>)

お問い合わせ先：日本ジェネリック株式会社
安全管理部 TEL：03-6684-2467

メトトレキサート錠「JG」



(01)14987792102620

J20250045