

## オランザピンOD錠2.5mg「JG」の生物学的同等性試験(溶出試験)

### 1.試験目的

オランザピンOD錠2.5mg「JG」は、オランザピンを主薬とする抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤である。今回、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に従い、ヒトを対象とした生物学的同等性試験により先発医薬品との同等性が確認されているオランザピンOD錠5mg「JG」を標準製剤として、溶出試験を実施した(処方変更水準:B水準)。

### 2.試験条件

試験法	回転数 (rpm)	試験液	温度 (°C)	試験液量 (mL)	ベッセル数	分析法
パドル法	50	pH1.2(日本薬局方 溶出試験第1液)	37±0.5	900	12	液体クロマトグラフィー
		pH5.0(薄めたMcIlvaine緩衝液)				
		pH6.8(日本薬局方 溶出試験第2液)				
		水				

### 3.判定基準

回転数 (rpm)	試験液	判定基準
50	pH1.2	平均溶出率:試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。 個々の溶出率:試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。
	pH5.0	
	pH6.8	
	水	平均溶出率:標準製剤の平均溶出率が約60%及び85%となる適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあるか、又はf2関数の値が50以上である。 個々の溶出率:試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。

### 4.試験結果

すべての試験条件において、判定時点における試験製剤の平均溶出率が判定基準に適合し、平均溶出率に対する個々の溶出率は判定基準の範囲内であった。


#### 判定時点における平均溶出率

回転数 (rpm)	試験液	判定時点 (分)	平均溶出率(%)			判定
			標準製剤	試験製剤	差	
50	pH1.2	15	99.3	99.8	-	適
	pH5.0	15	100.5	99.9	-	適
	pH6.8	15	99.6	99.8	-	適
	水	10	64.7	67.8	+3.1	適
		30	87.6	87.7	+0.1	


判定時点における個々の溶出率

回転数 (rpm)	試験液	判定時点 (分)	平均溶出率 (%)	個々の溶出率(%)	個々と平均の差 (%)	判定
				最小値～最大値		
50	pH1.2	15	99.8	97.2～102.2	-2.6～+2.4	適
	pH5.0	15	99.9	97.3～103.5	-2.6～+3.6	適
	pH6.8	15	99.8	98.6～101.8	-1.2～+2.0	適
	水	30	87.7	85.8～88.8	-1.9～+1.1	適


pH 1.2、50rpm




pH 5.0、50rpm



pH 6.8、50rpm



水、50rpm



6.結論

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に従いオランザピンOD錠2.5mg「JG」の生物学的同等性試験としての溶出試験を実施した。すべての試験条件で標準製剤オランザピンOD錠5mg「JG」と溶出挙動がガイドラインで定める同等性の判定基準に適合し、生物学的に同等とみなされた。

2016年5月

002