

一般名:リバーロキサバン

	自 社 製 品	類 似 薬
	リバーロキサバン OD 錠 10mg・15mg「JG」	イグザレルト OD 錠 10mg・15mg
効能又は効果	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制	<p>成人</p> <p>○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制</p> <p>○静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制</p> <p>小児</p> <p>○静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制</p> <p>○Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制</p>
用法及び用量	通常、成人にはリバーロキサバンとして15mgを1日1回食後に経口投与する。なお、腎障害のある患者に対しては、腎機能の程度に応じて10mg1日1回に減量する。	<p>〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉</p> <p>通常、成人にはリバーロキサバンとして15mgを1日1回食後に経口投与する。なお、腎障害のある患者に対しては、腎機能の程度に応じて10mg1日1回に減量する。</p> <p>〈静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉</p> <p>成人</p> <p>通常、成人には深部静脈血栓症又は肺血栓塞栓症発症後の初期3週間はリバーロキサバンとして15mgを1日2回食後に経口投与し、その後は15mgを1日1回食後に経口投与する。</p> <p>小児</p> <p>通常、体重30kg以上の小児にはリバーロキサバンとして15mgを1日1回食後に経口投与する。</p> <p>〈Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制〉</p> <p>通常、体重50kg以上の小児にはリバーロキサバンとして10mgを1日1回経口投与する。</p>