

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」の生物学的同等性試験(溶出試験)

1. 試験目的

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」はコハク酸ソリフェナシンを主薬とする過活動膀胱治療剤である。今回、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に従い、ヒトを対象とした生物学的同等性試験により先発医薬品との同等性が確認されているソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」を標準製剤として、溶出試験を実施した(処方変更水準:A水準)。

2. 試験条件

試験法	回転数 (rpm)	試験液	温度 (°C)	試験液量 (mL)	ベッセル数	分析法
パドル法	50	pH1.2(日本薬局方 溶出試験第1液)	37±0.5	900	12	液体クロマトグラフィー
		pH5.0(薄めたMcIlvaine緩衝液)				
		pH6.8(日本薬局方 溶出試験第2液)				
		0.2%塩化ナトリウム(NaCl)溶液*				

※ ガイドラインに「水において薬物が添加剤やベッセルに吸着する場合、水に替えて、0.2%NaCl 溶液を用いてよい」と記載されていることから、0.2%NaCl 溶液にて試験を行った。

3. 判定基準

回転数 (rpm)	試験液	判定基準
50	pH1.2	平均溶出率: 試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にある。
	pH5.0	
	pH6.8	個々の溶出率: 試験製剤の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。
	0.2%NaCl 溶液	

4. 試験結果

すべての試験条件において、判定時点における試験製剤の平均溶出率が判定基準に適合していることが確認され、平均溶出率に対する個々の溶出率は判定基準の範囲内であった。

判定時点における平均溶出率


回転数 (rpm)	試験液	判定時点 (min)	溶出率 (%)			判定
			標準製剤	試験製剤	差	
50	pH1.2	15	97.5	97.3	—	適
	pH5.0	15	96.0	97.8	—	適
	pH6.8	15	93.5	97.3	—	適
	0.2%NaCl 溶液	15	96.8	100.8	—	適

判定時点における個々の溶出率


回転数 (rpm)	試験液	判定時点 (min)	溶出率 (%)	個々の溶出率 (%)	個々と平均の差 (%)	判定
				最小値~最大値		
50	pH1.2	15	97.3	93.5~99.8	-3.8~+2.5	適
	pH5.0	15	97.8	96.0~99.8	-1.8~+2.0	適
	pH6.8	15	97.3	95.9~99.2	-1.4~+1.9	適
	0.2%NaCl 溶液	15	100.8	98.8~103.2	-2.0~+2.4	適

溶出プロファイル


pH1.2、50rpm




pH5.0、50rpm



pH6.8、50rpm



0.2%NaCl 溶液、50rpm



5. 結論

「含量が異なる経口固形剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に従いソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」の生物学的同等性試験としての溶出試験を実施した。すべての試験条件で標準製剤ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」と溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。

令和3年3月

001