

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15% 「TCK」

組成	1 g 中にトスフロキサシントシル酸塩水和物（日局）を 150 mg（トスフロキサシンとして 102 mg）含有する。
用法及び用量	通常、小児に対してはトスフロキサシントシル酸塩水和物として 1 日 12 mg/kg（トスフロキサシンとして 8.2 mg/kg）を 2 回に分けて経口投与する。 ただし、1 回 180 mg、1 日 360 mg（トスフロキサシンとして 1 回 122.4 mg、1 日 244.8 mg）を超えないこととする。

年 齢 (目 安)	体 重 (k g)	トスフロキサシントシル酸塩水和物として		トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15% 「TCK」 として	
		(mg/回)	(mg/日)	(g/回)	(g/日)
1 歳	10	60	120	0.40	0.80
	11	66	132	0.44	0.88
2 歳	12	72	144	0.48	0.96
	13	78	156	0.52	1.04
3 歳	14	84	168	0.56	1.12
4 歳	15	90	180	0.60	1.20
	16	96	192	0.64	1.28
	17	102	204	0.68	1.36
	18	108	216	0.72	1.44
	19	114	228	0.76	1.52
	20	120	240	0.80	1.60
6 歳	21	126	252	0.84	1.68
	22	132	264	0.88	1.76
	23	138	276	0.92	1.84
	24	144	288	0.96	1.92
8 歳	25	150	300	1.00	2.00
	26	156	312	1.04	2.08
	27	162	324	1.08	2.16
	28	168	336	1.12	2.24
	29	174	348	1.16	2.32
	30	180	360	1.20	2.40

注) この体重別用量は参考として作成したものであり、年齢は目安として示したものです。