

貯法：室温保存
有効期間：3年

	承認番号	販売開始
配合錠MD	22800AMX00510000	2016年12月
配合錠EX	22800AMX00509000	2016年12月

選択的AT₁受容体ブロッカー／利尿薬合剤日本薬局方 **バルサルタン・ヒドロクロロチアジド錠****バルヒディオ配合錠MD「JG」****バルヒディオ配合錠EX「JG」**

VALHYDIO Combination Tablets

処方箋医薬品^注)

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 チアジド系薬剤又はその類似化合物（例えばクロロタリドン等のスルホンアミド誘導体）に対する過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]
- 2.4 無尿の患者又は透析患者 [本剤の効果が期待できない。] [9.2.1 参照]
- 2.5 急性腎不全の患者 [9.2.2 参照]
- 2.6 体液中のナトリウム・カリウムが明らかに減少している患者 [低ナトリウム血症、低カリウム血症等の電解質失調を悪化させるおそれがある。] [11.1.6 参照]
- 2.7 アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く） [10.1 参照]
- 2.8 デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者 [10.1 参照]

3. 組成・性状**3.1 組成**

販売名	有効成分 (1錠中)	添加剤
バルヒディオ配合錠MD「JG」	日周 バルサルタン 80.0mg 日周 ヒドロクロロチアジド 6.25mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素カルシウム水和物、ポビドン、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、三酸化鉄、カルナウバロウ
バルヒディオ配合錠EX「JG」	日周 バルサルタン 80.0mg 日周 ヒドロクロロチアジド 12.5mg	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素カルシウム水和物、ポビドン、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、三酸化鉄、カルナウバロウ

3.2 製剤の性状

販売名	色・剤形	外形・大きさ・重量			本体表示
		表面	裏面	側面	
バルヒディオ配合錠MD「JG」	うすい赤色のフィルムコーティング錠				バルヒディオ MD JG
		直径 8.6mm	厚さ 4.1mm	重量 227mg	
バルヒディオ配合錠EX「JG」	ごくうすい赤色のフィルムコーティング錠				バルヒディオ EX JG
		直径 8.6mm	厚さ 4.1mm	重量 227mg	

4. 効能又は効果

高血圧症

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。
- 5.2 原則として、バルサルタン80mgで効果不十分な場合に本剤の使用を検討すること。 [8.1 参照]

6. 用法及び用量

成人には1日1回1錠（バルサルタン/ヒドロクロロチアジドとして80mg/6.25mg又は80mg/12.5mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤は、バルサルタン80mgとヒドロクロロチアジド6.25mgあるいは12.5mgとの配合剤であり、バルサルタンとヒドロクロロチアジド双方の副作用が発現するおそれがあり、適切に本剤の使用を検討すること。 [5.2 参照]
- 8.2 ヒドロクロロチアジドは高尿酸血症を発現させるおそれがあるので、定期的に血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。
- 8.3 ヒドロクロロチアジドは低カリウム血症を起こすことが知られているので、定期的に血清カリウム値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。 [9.1.2 参照]
- 8.4 バルサルタンを含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中に肝炎等の重篤な肝障害があらわれたとの報告があるので、肝機能検査を実施するなど観察を十分に行うこと。 [11.1.3 参照]
- 8.5 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン-アンジオテンシン系の抑制作用による低血圧を起こす可能性がある。
- 8.6 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 8.7 本剤の利尿効果は急激にあらわれることがあるので、電解質失調、脱水に十分注意すること。
- 8.8 夜間の休息が特に必要な患者には、夜間の排尿を避けるため、午前中に投与することが望ましい。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意**9.1 合併症・既往歴等のある患者****9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者**

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与は避けること。腎血流量の減少や糸球体濾過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。

9.1.2 血清カリウム値異常の患者

[8.3、9.1.3 参照]

9.1.3 高カリウム血症の患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与は避けること。バルサルタンは、高カリウム血症を増悪させるおそれがある。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、血清カリウム値に注意すること。[9.1.2、11.1.5 参照]

9.1.4 脳血管障害のある患者

過度の降圧が脳血流不全を引き起こし、病態を悪化させるおそれがある。

9.1.5 減塩療法中の患者

低ナトリウム血症を起こすおそれがある。また、嚴重な減塩療法中の患者では、一過性の急激な血圧低下（失神及び意識消失等を伴う）を起こすおそれがある。[11.1.7 参照]

9.1.6 重篤な冠動脈硬化症又は脳動脈硬化症のある患者

急激な利尿があらわれた場合、急速な血漿量減少、血液濃縮を来し、血栓塞栓症を誘発するおそれがある。

9.1.7 本人又は両親、兄弟に痛風、糖尿病のある患者及び高尿酸血症のある患者

高尿酸血症、高血糖症を来し、痛風、糖尿病の悪化や顕性化のおそれがある。

9.1.8 下痢、嘔吐のある患者

電解質失調があらわれるおそれがある。

9.1.9 高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症のある患者

血清カルシウムを上昇させるおそれがある。

9.1.10 交感神経切除後の患者

本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 透析患者

投与しないこと。本剤の効果が期待できない。[2.4 参照]

9.2.2 急性腎不全の患者

投与しないこと。腎機能を更に悪化させるおそれがある。[2.5 参照]

9.2.3 重篤な腎機能障害（血清クレアチニン値が2.0mg/dLを超える）のある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与は避けること。ヒドロクロロチアジドにより腎血流量が低下するおそれがある。なお、バルサルタンにより腎機能障害が悪化するおそれもある。

9.2.4 腎機能障害患者（透析患者、急性腎不全の患者を除く）

定期的に血清クレアチニン値及び血清尿酸値のモニタリングを実施し、観察を十分に行うこと。血清クレアチニン値上昇及び血清尿酸値上昇のおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 肝障害のある患者、特に胆汁性肝硬変及び胆汁うっ滞のある患者

バルサルタンは主に胆汁中に排泄されるため、血中濃度が上昇するおそれがある。外国において、軽度～中等度の肝障害患者でバルサルタンの血漿中濃度が、健康成人と比較して約2倍に上昇することが報告されている。また、ヒドロクロロチアジドは肝性昏睡を誘発するおそれがある。[16.5 参照]

9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性

妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている^{1), 2)}。

本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

(1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

(2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。また、投与中も必要に応じ説明すること。

・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。

・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。

・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。バルサルタンを含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤で、妊娠中期～末期に投与された患者に胎児・新生児死亡、羊水過少症、胎児・新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全、羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、脳、頭蓋顔面の奇形、肺の發育形成不全等があらわれたとの報告がある^{3), 4)}。また、海外で実施されたアンジオテンシン変換酵素阻害剤におけるレトロスペクティブな疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスクは降圧剤が投与されていない患者群に比べて高かったとの報告がある⁵⁾。ヒドロクロロチアジドを含むチアジド系薬剤では新生児又は乳児に高ビリルビン血症、血小板減少症等を起こすことがある。また、利尿効果に基づく血漿量減少、血液濃縮、子宮・胎盤血流量減少等があらわれることがある。[2.3、9.4.1 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。バルサルタンにおける動物実験（ラットの授乳期経口投与）の3mg/kg/日で、乳汁中へ移行するとの報告がある。また、動物実験（ラットの周産期及び授乳期経口投与）の600mg/kg/日で出生児の低体重及び生存率の低下が認められており、200mg/kg/日以上で外表分化の遅延が認められている。ヒドロクロロチアジドはヒト母乳中へ移行することが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

9.8.1 一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

9.8.2 バルサルタン単独投与による高齢者での薬物動態試験で、バルサルタンの血漿中濃度が非高齢者に比べて高くなることが認められている。

9.8.3 急激な利尿は血漿量の減少を来し、脱水、低血圧等による立ちくらみ、めまい、失神等を起こすことがある。

9.8.4 特に心疾患等で浮腫のある高齢者では急激な利尿は急速な血漿量の減少と血液濃縮を来し、脳梗塞等の血栓塞栓症を誘発するおそれがある。

9.8.5 低ナトリウム血症、低カリウム血症があらわれやすい。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスケレンフマル酸塩ラジレス （糖尿病患者に使用する 場合。ただし、他の 降圧治療を行ってもな お血圧のコントロール が著しく不良の患者を 除く。） [2.7 参照]	非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
デスマプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルト （男性における夜間多尿による夜間頻尿） [2.8 参照]	低ナトリウム血症が発現するおそれがある。	ヒドロクロロチアジドとデスマプレシン酢酸塩水和物のいずれも低ナトリウム血症が発現するおそれがある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスケレンフマル酸塩	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。 なお、eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスケレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	レニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿降圧剤 フロセミド トリクロルメチアジド 等 [11.1.7 参照]	一過性の急激な血圧低下 (失神及び意識消失等を 伴う) を起こすおそれ がある。	利尿降圧剤で治療を受けている 患者にはレニン活性が亢進して いる患者が多く、バルサルタン が奏効しやすい。 重度のナトリウムないし体液量 の減少した患者では、まれに症 候性の低血圧が生じることが ある。
カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン トリウムテレン等 カリウム補給製剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇す ることがある。	バルサルタンのアルドステロン 分泌抑制によりカリウム貯留作 用が増強する可能性がある。 危険因子：腎機能障害
ドロスピレノン・エチニ ルエストラジオール		バルサルタンによる血清カリウ ム値の上昇とドロスピレノンの 抗ミネラルコルチコイド作用に よると考えられる。 危険因子：腎障害患者、血清カ リウム値の高い患者
トリメトプリム含有製剤 スルファメトキサゾ ール・トリメトプリム		血清カリウム値の上昇が増強さ れるおそれがある。
シクロスポリン		高カリウム血症の副作用が相互 に増強されると考えられる。
シクロスポリン	高尿酸血症及びこれに伴 う痛風があらわれやすい ので、血中尿酸値に注意 すること。	高尿酸血症の副作用が相互に増 強される可能性が考えられる。
非ステロイド性消炎鎮痛 剤 (NSAIDs) インドメタシン等	本剤の降圧作用が減弱す ることがある。 腎機能を悪化させるおそ れがある。	NSAIDsの腎プロスタグランジ ン合成阻害作用により、本剤の 降圧作用が減弱することがあ る。 NSAIDsの腎プロスタグランジ ン合成阻害作用により、腎血流 量が低下するためと考えられ る。 危険因子：高齢者
ビキサロマー	バルサルタンの血中濃度 が約30～40%に低下した との報告がある。バルサル タンの作用が減弱する おそれがある。	リン酸結合性ポリマーにより、 同時に服用した場合、バルサル タンの吸収を遅延あるいは減少 させる可能性がある。
バルビツール酸誘導体	起立性低血圧が増強され ることがある。	これらの薬剤の中樞抑制作用と ヒドロクロロチアジドの降圧作 用による。
あへんアルカロイド系麻 薬		ヒドロクロロチアジドとあへん アルカロイドの大量投与で血圧 低下があらわれる可能性がある。 ヒドロクロロチアジドと血管拡 張作用を有するアルコールとの 併用により降圧作用が増強され る可能性がある。
アルコール		
昇圧アミン ノルアドレナリン アドレナリン	昇圧アミンの作用を減弱 することがある。手術前 の患者に使用する場合、 本剤の一時休薬等の処置 を講ずること。	ヒドロクロロチアジドは昇圧ア ミンに対する血管壁の反応性を 低下させる可能性がある。
ツボクラリンの類似作用 物質 パンクロニウム臭化物	ツボクラリンの類似作用 物質の麻痺作用を増強す ることがある。手術前 の患者に使用する場合、 本剤の一時休薬等の処置 を講ずること。	ヒドロクロロチアジドによる血 清カリウム値の低下により、こ れらの薬剤の神経・筋遮断作 用が増強すると考えられている。
降圧作用を有する他の薬 剤 β-遮断剤 ニトログリセリン等	降圧作用を増強するおそ れがある。 降圧剤の用量調節等に注 意すること。	作用機序の異なる降圧作用に より互いに協力的に作用する。
ジギタリス製剤 ジゴキシン ジギトキシン	ジギタリスの心臓に対す る作用を増強し、不整脈 等を起こすことがある。 血清カリウム値に十分注 意すること。	ヒドロクロロチアジドによる血 清カリウム値の低下により多量 のジギタリスが心筋Na-K ATPaseに結合し、心収縮力増 強と不整脈が起こる。マグネシ ウム低下も同様の作用を示す。
乳酸ナトリウム	チアジド系薬剤による代 謝性アルカローシス、低 カリウム血症を増強する ことがある。	ヒドロクロロチアジドのカリウ ム排泄作用により低カリウム血 症や代謝性アルカローシスが引 き起こされることがある。アル カリ化剤である乳酸ナトリウム の併用はこの状態を更に増強さ せる。
リチウム	振戦、消化器愁訴等、リ チウム中毒を増強するこ とがある。血清リチウム 濃度に注意すること。 リチウム中毒を起こすこ とが報告されている。	ヒドロクロロチアジドは腎にお けるリチウムの再吸収を促進 し、リチウムの血中濃度を上昇 させる。 バルサルタンのナトリウム排泄 作用により、リチウムの蓄積が 起こると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
副腎皮質ホルモン剤 ACTH	低カリウム血症が発現す ることがある。	ヒドロクロロチアジドとこれら の薬剤はともにカリウム排泄作 用を有する。
グリチルリチン製剤	血清カリウム値の低下が あらわれやすくなる。	グリチルリチン製剤は低カリウ ム血症を主徴とした偽アルドス テロン症を引き起こすことがあ る。したがってヒドロクロロチ アジドとグリチルリチン製剤の 併用により低カリウム血症を増 強する可能性がある。
糖尿病用剤 SU剤 インスリン等	糖尿病用剤の作用を著し く減弱することがある。	機序は明確ではないが、ヒドロ クロロチアジドによるカリウム 喪失により膵臓のβ細胞のイン スリン放出が低下すると考えら れている。
ジアゾキシド	ジアゾキシドの血糖上昇 作用及び血中尿酸上昇作 用が増強するおそれがある。	機序は明確ではないが、ヒドロ クロロチアジドによるカリウム 喪失により膵臓のβ細胞のイン スリン放出が低下すると考えら れている。また、ヒドロクロロ チアジドとジアゾキシドはとも に尿酸排泄抑制作用を有する。
陰イオン交換樹脂剤 コレステラミン等	チアジド系薬剤の作用が 減弱することがある。陰 イオン交換樹脂剤投与の 少なくとも4時間前に投 与する等、投与時間をず らすことで薬剤相互作用 を最小限にできるとの報 告がある。	陰イオン交換樹脂剤の吸着作用 によりヒドロクロロチアジドの 吸収が阻害されることがある。
アマンタジン	アマンタジンの作用が増 強されることがある。	ヒドロクロロチアジドがアマン タジンの腎排泄を低下させ、血 中濃度の上昇を起こすためと考 えられる。
アロプリノール	重症の過敏反応 (悪寒、 全身性の皮疹等) が発現 したとの報告がある。	機序は不明である。
抗コリン作用を有する薬 剤 アトロピン ピペリデン	チアジド系薬剤の作用が 増強されるおそれがある。	チアジド系薬剤の吸収が促進さ れる可能性が考えられる。
メチルドパ	チアジド系薬剤との併用 による溶血性貧血の報告 がある。	メチルドパがチアジド系薬剤の 抗体産生を促進する可能性が考 えられる。
抗腫瘍剤 シクロホスファミド メトトレキサート等	これらの薬剤の骨髄抑制 作用を増強するおそれ がある。	チアジド系薬剤が抗腫瘍剤の腎 排泄を減少させるためと考えら れる。
ビタミンD カルシウム剤	高カルシウム血症を起 すおそれがある。	血清カルシウム濃度の上昇をチ アジド系薬剤と相互に増強させ る可能性が考えられる。
カルバマゼピン	低ナトリウム血症があら われることがある。	ヒドロクロロチアジドとカルバ マゼピンはともに血清中のナト リウムを低下させることがあ る。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 アナフィラキシー (頻度不明)

11.1.2 血管浮腫 (頻度不明)

顔面、口唇、咽頭、舌の腫脹等が症状としてあらわれることがある。

11.1.3 肝炎 (頻度不明)

[8.4 参照]

11.1.4 腎不全 (頻度不明)

11.1.5 高カリウム血症 (頻度不明)

[9.1.3 参照]

11.1.6 低ナトリウム血症 (頻度不明)

けん怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがある。高齢者であらわれやすい。
[2.6 参照]

11.1.7 ショック、失神、意識消失 (いずれも頻度不明)

冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。[9.1.5、10.2 参照]

11.1.8 無顆粒球症、白血球減少、血小板減少 (いずれも頻度不明)

11.1.9 再生不良性貧血、溶血性貧血 (いずれも頻度不明)

重篤な血液障害があらわれることがある。

11.1.10 壊死性血管炎（頻度不明）

11.1.11 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑（いずれも頻度不明）

11.1.12 天疱瘡、類天疱瘡（いずれも頻度不明）

水疱、びらん等があらわれた場合には、皮膚科医と相談すること。

11.1.13 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.14 肺水腫、急性呼吸窮迫症候群（いずれも頻度不明）

肺水腫があらわれることがある。また、ヒドロクロロチアジド服用後、数分から数時間以内に急性呼吸窮迫症候群が発現したとの報告がある⁽⁶⁾⁻⁽⁹⁾。

11.1.15 全身性エリテマトーデスの悪化（頻度不明）

11.1.16 低血糖（頻度不明）

脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。糖尿病治療中の患者であらわれやすい。

11.1.17 横紋筋融解症（頻度不明）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.18 急性近視、閉塞隅角緑内障（いずれも頻度不明）

急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。

11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
皮膚障害	—	発疹、光線過敏症、そう痒症、蕁麻疹、紅斑	紫斑、皮膚エリテマトーデス
精神神経系障害	めまい、頭痛	傾眠	不眠症、知覚異常、しびれ、味覚異常
血液及びリンパ系障害	白血球数増加	好酸球数増加、貧血	—
心臓障害	—	不整脈、動悸	頻脈、心房細動
血管障害	低血圧	起立性低血圧	顔面潮紅、ほてり
胃腸障害	—	腹痛、腹部不快感、下痢、嘔気	腸炎、嘔吐、便秘
肝胆道系障害	肝機能異常、 γ -GTP増加、AST増加、ALT増加、血中ビリルビン増加	LDH増加、ALP増加	黄疸、胆汁うっ滞
呼吸器障害	—	咳嗽、咽頭炎	呼吸困難、鼻閉
腎及び尿路障害	BUN増加、血中クレアチニン増加、蛋白尿、尿中血陽性	—	—
代謝及び栄養障害	高血糖、高尿酸血症	低カリウム血症、血中コレステロール増加、血中トリグリセリド増加、尿糖陽性	食欲不振、低マグネシウム血症、低クロール性アルカロシス、血中カルシウム増加、総蛋白減少、脱水
その他	CK増加	疲労、けん怠感、胸痛、浮腫、関節痛、腰部痛、筋痙攣	筋肉痛、脱力感、口渇、唾液腺炎、インポテンズ、高カルシウム血症を伴う副甲状腺障害、黄視症、視力異常（霧視等）、耳鳴、発熱

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

甲状腺障害のない患者の血清PBIを低下させることがある。

13. 過量投与

13.1 症状

バルサルタンの過量投与により、著しい血圧低下が生じ、意識レベルの低下、循環虚脱に至るおそれがある。

13.2 処置

著しい低血圧の場合には、患者を仰臥位にし、速やかに生理食塩液等の静脈注射など適切な処置を行うこと。なお、バルサルタンの血漿蛋白結合率は93~96%であり、血液透析によって除去できないが、ヒドロクロロチアジドは透析により除去することができる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

海外で実施された疫学研究において、ヒドロクロロチアジドを投与された患者で、基底細胞癌及び有棘細胞癌のリスクが増加することが報告されている^{(10)、(11)}。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男子にバルサルタン／ヒドロクロロチアジド配合錠を単回経口投与したとき、速やかに吸収され、バルサルタン及びヒドロクロロチアジドは、それぞれ投与後約3及び1.5時間で最高濃度に到達し、消失半減期はそれぞれ約6及び9時間であった⁽²⁾。

健康成人男子にバルサルタン／ヒドロクロロチアジド配合錠を単回経口投与したときのバルサルタン及びヒドロクロロチアジドの薬物動態パラメータ


薬物動態パラメータ	VAH80/6.25mg (n=50)		VAH80/12.5mg (n=52)	
	バルサルタン	ヒドロクロロチアジド	バルサルタン	ヒドロクロロチアジド
Cmax (ng/mL)	3,483±1,660	47±8	3,582±1,181	93±23
Tmax (h)	3.0 (1.0~4.0)	1.5 (1.0~4.0)	2.8 (1.0~6.0)	1.5 (1.0~4.0)
AUC _{0-∞} (ng·h/mL)	21,745±10,617	325±56	21,498±6,793	638±106
t _{1/2} (h)	5.7±1.0	8.9±0.8	6.3±3.3	8.6±0.7

VAH：バルサルタンとヒドロクロロチアジドの配合剤、Cmax、AUC_{0-∞}、t_{1/2}：平均値±標準偏差、Tmax：中央値（最小~最大）

16.1.2 生物学的同等性試験

バルヒディオ配合錠EX [JG] とコディオ配合錠EXを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（バルサルタン、ヒドロクロロチアジドとしてそれぞれ80mg、12.5mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80)~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁽³⁾。

(1) バルサルタン




薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₄ (µg·hr/mL)	Cmax (µg/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
バルヒディオ配合錠EX [JG]	52.31±14.89	7.21±1.71	2.9±1.1	6.1±1.2
コディオ配合錠EX	55.80±13.44	7.96±1.80	3.0±0.9	6.1±0.9

(Mean±S.D., n=19)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(2) ヒドロクロロチアジド



薬物動態パラメータ

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₃₆ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
バルヒディオ配合錠EX [JG]	539.92±132.23	76.78±20.44	2.2±0.7	8.5±2.8
コディオ配合錠EX	547.22±124.12	83.00±19.09	1.9±0.8	8.1±1.7

(Mean±S.D., n=19)

血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人男子にバルサルタン／ヒドロクロロチアジド配合錠80/12.5mgを単回経口投与したとき、空腹時投与に比べて食後投与でバルサルタンのCmax及びAUCはそれぞれ32%及び37%低下し、ヒドロクロロチアジドのCmax及びAUCはそれぞれ36%及び22%低下した¹⁴⁾。

16.3 分布

バルサルタン及びヒドロクロロチアジドの血漿蛋白結合率はそれぞれ93～96%¹⁵⁾及び58%¹⁶⁾であった(外国人のデータ)。

16.4 代謝

健康成人男子に¹⁴Cバルサルタン80mgを空腹時単回経口投与8時間後の血漿中には、主として未変化体が存在し、その他に代謝物として4-ヒドロキシ体が認められ¹⁷⁾、*in vitro*の試験において主としてCYP2C9の関与が示唆されている¹⁸⁾(外国人のデータ)。

ヒドロクロロチアジドはほとんど代謝を受けず、大部分が未変化体のまま排泄される¹⁹⁾(外国人のデータ)。

16.5 排泄

健康成人男子にバルサルタン80mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgを併用単回投与したとき、投与後24時間までにそれぞれ投与量の12.0%及び74.4%が未変化体として尿中に排泄された²⁰⁾。[9.3.1 参照]

16.7 薬物相互作用

健康成人男子にバルサルタン80mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgを併用単回投与したときのバルサルタン及びヒドロクロロチアジドの薬物動態は各単剤投与後と差はなく、バルサルタンとヒドロクロロチアジドの間に薬物動態学的相互作用は認められなかった²⁰⁾。

16.8 その他

バルヒディオ配合錠MD [JG]は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日薬食審査発0229第10号別紙2)」に基づき、バルヒディオ配合錠EX [JG]を標準製剤とした溶出試験の結果、溶出挙動は同等と判定され、生物学的に同等とみなされた²¹⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅲ相試験

軽症から中等症の本態性高血圧症を対象に国内で実施した二重盲検比較試験(要因試験)において、バルサルタン／ヒドロクロロチアジド配合錠(以下、配合錠)の1日1回8週間経口投与における有効症例(試験終了時の拡張期血圧が90mmHg未満

に低下又はベースラインと比較して10mmHg以上低下)の割合は、配合錠80/6.25mgで70.3%、80/12.5mgで83.3%であり、バルサルタン80mg単独投与(54.4%)と比較し、優れた降圧効果が認められた。

有効症例の割合及び試験終了時における収縮期血圧、拡張期血圧のベースラインからの変化量は次表のとおりである。

	有効症例の割合	試験終了時における収縮期血圧/拡張期血圧のベースラインからの変化量 ²²⁾
VAH80/12.5mg	83.3% (55/66)	-21.95/-13.44mmHg
VAH80/6.25mg	70.3% (45/64)	-17.95/-13.50mmHg
V80mg	54.4% (37/68)	-12.97/-9.12mmHg
H12.5mg	53.0% (35/66)	-11.18/-9.15mmHg
H6.25mg	32.8% (20/61)	-9.64/-7.02mmHg
プラセボ	34.8% (23/66)	-5.04/-5.56mmHg

注) 共分散分析モデルに基づいて求めた最小二乗平均値

VAH:バルサルタンとヒドロクロロチアジドの配合剤、

V:バルサルタン、H:ヒドロクロロチアジド

副作用発現頻度は、配合錠80/12.5mgで50.0%(33/66例)及び配合錠80/6.25mgで46.9%(30/64例)であった。主な副作用は、配合錠80/12.5mgでは高尿酸血症12.1%(8/66例)及び血中尿酸増加10.6%(7/66例)、配合錠80/6.25mgでは血中尿酸増加15.6%(10/64例)及び高尿酸血症9.4%(6/64例)であった²²⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤は、バルサルタン及びヒドロクロロチアジドの配合剤である。バルサルタンは、アンジオテンシンⅡ受容体のサブタイプであるAT₁受容体に結合し、昇圧系として作用するアンジオテンシンⅡに対して拮抗することによって降圧効果をあらわす。ヒドロクロロチアジドはチアジド系利尿剤で、主として遠位尿細管でのNa及び水の再吸収を抑制し、尿排泄を増加させることにより循環血漿量の減少を引き起こし降圧効果を発揮する。ヒドロクロロチアジドのナトリウム利尿作用によりレニン・アンジオテンシン系が活性化され、バルサルタンの降圧効果が増強されると考えられている²³⁾。

18.2 降圧作用

高血圧自然発症ラットにおいてバルサルタンとヒドロクロロチアジドを併用投与したとき、それぞれの単独投与と比較して降圧効果の増強が認められた²⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的見解

一般名:バルサルタン (Valsartan)

化学名:(2S)-3-Methyl-2-(N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]pentanamido)butanoic acid


分子式:C₂₄H₂₉N₅O₃

分子量:435.52

性状:白色の粉末である。

メタノール又はエタノール(99.5)に極めて溶けやすく、水にほとんど溶けない。

構造式:



一般名:ヒドロクロロチアジド (Hydrochlorothiazide)


化学名:6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide

分子式:C₇H₈ClN₃O₄S₂

分子量:297.74

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は僅かに苦い。
アセトンに溶けやすく、アセトニトリルにやや溶けにくく、水又はエタノール（95）に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
水酸化ナトリウム試液に溶ける。

構造式：



融点：約267°C（分解）

22. 包装

〈バルヒディオ配合錠MD [JG]〉

140錠 [14錠 (PTP) × 10]

〈バルヒディオ配合錠EX [JG]〉

140錠 [14錠 (PTP) × 10]

23. 主要文献

- 1) 阿部真也 他：周産期医学 2017；47：1353-1355
- 2) 齊藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌 2021；29：49-54
- 3) Sheps, S.G. et al.：Arch. Intern. Med. 1997；157 (21)：2413-2446
- 4) Briggs, G.G. et al.：Ann. Pharmacother. 2001；35 (7-8)：859-861
- 5) Cooper, W.O. et al.：N. Engl. J. Med. 2006；354 (23)：2443-2451
- 6) Rai, A. et al.：Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2016；193：A1890
- 7) Jansson, P.S. et al.：J. Emerg. Med. 2018；55：836-840
- 8) Vadas, P.：Am. J. Emerg. Med. 2020；38：1299.e1-2
- 9) Kane, S.P. et al.：Perfusion. 2018；33：320-322
- 10) Pottegard, A. et al.：J. Intern. Med. 2017；282 (4)：322-331
- 11) Pedersen, S.A. et al.：J. Am. Acad. Dermatol. 2018；78 (4)：673-681
- 12) 配合剤投与時と単剤併用時の生物学的同等性の検討（コディオ配合錠：2009年1月21日承認、申請資料概要 2.7.6-1.2.2）
- 13) 社内資料：生物学的同等性試験（配合錠EX）
- 14) 薬物動態に対する食事の影響（コディオ配合錠：2009年1月21日承認、申請資料概要 2.7.6-1.1.1）
- 15) Colussi, D.M. et al.：J. Clin. Pharmacol. 1997；37 (3)：214-221
- 16) Brunton, L.L. et al.：Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. 2000；p1832
- 17) Waldmeier, F. et al.：Xenobiotica. 1997；27 (1)：59-71
- 18) Nakashima, A. et al.：Xenobiotica. 2005；35 (6)：589-602
- 19) Beermann, B. et al.：Clin. Pharmacol. Ther. 1976；19(5 Pt1)：531-537
- 20) バルサルタンとヒドロクロロチアジドの薬物間相互作用の検討（コディオ配合錠：2009年1月21日承認、申請資料概要 2.7.6-3.1.1）
- 21) 社内資料：生物学的同等性試験（配合錠MD）
- 22) 川名正敏：新薬と臨牀 2009；58 (4)：583-596
- 23) 作用機序（コディオ配合錠：2009年1月21日承認、申請資料概要 2.4.1）
- 24) 高血圧自然発症ラットを用いたバルサルタンとヒドロクロロチアジドの併用投与による降圧効果（コディオ配合錠：2009年1月21日承認、申請資料概要 2.6.2-2.1.1）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室
〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号