エソメプラゾール錠「JG」
服用される患者さまへ

このお薬は、胃酸の分泌を抑制するお薬です。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、逆流性食道炎をはじめ、非ステロイド性抗炎症薬や低用量アスピリン投与時における薬剤性潰瘍の再発を抑制したり、ヘリコバクター・ピロリの除菌を補助します。

（実寸ではありません）

お薬に灰赤色の粒が不均一に入っているように見えますが、効き目に変わりはありません。

服用前の確認

次のような方は、服用前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- お薬や食べ物で、かゆみや発疹などのアレルギー症状が出たことがある方
- 肝臓に障害のある方
- 妊娠または授乳中の方
- 他のお薬などを使用している方

セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品は、薬の働きを弱める可能性があるので、ご注意ください。

裏面もお読みください

服用時の注意

◆ 通常、１日１回服用しますが、お薬を飲む量や回数などは、患者さまの年齢や症状によって異なるため、必ず医師の指示どおりに服用してください。

◆ 飲み忘れた場合は、気づいたときにできるだけ早く１回分を服用してください。２回分を一度に服用しないでください。

◆ 誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

◆ ご自分の判断で服用を中止しないでください。

主な副作用

◆ 発疹、皮膚炎、頭痛、口内炎、味覚異常、吐き気、食道炎、腹痛、腹部膨満、軟便、下痢、便秘などがあらわれることがあります。このような症状に気づいたら、医師または薬剤師にご相談ください。

◆ まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような症状があらわれたら、服用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

・呼吸困難、蕁麻疹、顔・くちびる・舌などがはれる
[ショック、アナフィラキシー]

・体がだるい、発熱、息切れ、鼻血・皮下出血
[汎血球減少症、無顆粒球症、溶血性貧血、血小板減少]

・吐き気や嘔吐、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる
[劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全]

・発熱、全身倦怠感、皮膚・眼・口内に発疹ができる・赤くなる
[中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群]

・発熱、咳、息切れ [間質性肺炎]

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

日本ジェネリック株式会社
ESOME-PG-1JG
2026.09