

# エゼロス配合錠「JG」 服用される患者さまへ

このお薬は、血液中のコレステロールを低下させる2つの有効成分（エゼチミブ、ロスバスタチン）が配合されています。

## 副作用について

- ◆ エゼロス配合錠の服用によって、エゼチミブとロスバスタチン両剤の副作用が出る場合があります。  
主な副作用として、感覚鈍麻、便秘、発疹、紅斑、背部痛、四肢不快感などが報告されています。
- ◆ 重大な副作用として、ごくまれに**横紋筋融解症※**が起こることが知られています。  
次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので、直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力が入らない
- 尿の色が濃い（赤褐色になる）

## 服用時の注意

- ◆ 1日1回1錠、食後に服用してください。
- ◆ 飲み忘れた場合は、気が付いたとき、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。
- ◆ 誤って多く飲み、異常を感じた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆ ご自身の判断で、薬の量を変えたり服用を中止したりせず、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

### ※横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる）になることもあります。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先