

ラコサミド錠/ドライシロップ「JG」 服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬は、抗てんかん薬と呼ばれるグループに属する薬です。脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。

服用方法

- ◆ お薬に慣れるため少しずつお薬の量を調整していく期間と、症状がコントロールできたところで、そのお薬の量をそのまま維持して服用する期間に分けられます。
- ◆ お薬の量やお薬を調整する期間は、服用される方の状態によって医師が決定しますので、指示に従って決められた量を服用してください。
- ◆ ご自身の判断でお薬の量を増やしたり、減らしたりしないでください。

副作用について①

- ◆ 服用中にめまい、眠気、頭痛、吐き気・嘔吐といった副作用がみられることがあります。
特にめまい、眠気は服用し始めやお薬を増やした後にみられやすいですが、服用を続けることで次第に慣れていくことがあります。
- ◆ 副作用があらわれてもご自身の判断で服用をやめないでください。
- ◆ 気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

副作用について②

- ◆ 特に気をつけていただきたいまれな副作用として次のような症状があらわれることがあります。

このような副作用がみられた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 不整脈などの脈拍や心臓の異常を感じる。
- 自分を傷つけたい、この世から消えてしまいたいという気持ちになる。
- 目の充血、くちびるのただれ、皮ふの広い範囲が赤くなる。
- リンパ節の腫れ。

服用中に気をつけていただくこと

- ◆ ふわふわしためまい、目がかすむ、眠気、注意力、集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作などは行わないようにしてください。
- ◆ このお薬は、体調が良くなったと自己判断し、服用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

連絡先