

ペランパネルOD錠/細粒「タカタ」 服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。


服用方法

- 1日1回 **寝る前**に服用してください。
- 飲み忘れてしまった場合には、気づいた日の寝る前に服用してください。翌日からまた続けて、寝る前に毎日服用してください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- このお薬は、年齢、てんかん発作の種類や一緒に服用する他のお薬によって、飲み続ける量や調節の仕方が異なることがあります。

少ない量から開始し、1週間もしくは2週間以上の間隔をあけて2mgずつ量を増やしていきます。

必ず医師の指示に従ってください。

調節の仕方：1週間または
2週間以上の間隔をあけて
2mgずつ量を増やす



(裏面もお読みください)

副作用について

- めまい、眠気、発疹、かゆみ、易刺激性（ちょっとした刺激で気持ちや体調が変わる）などの症状がでることがあります。特に高齢の方は、転倒のおそれが高いため、十分に注意してください。

服用中に気を付けていただくこと

- めまい、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う操作などは行わないようにしてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、すぐに医師にご相談ください。
 - *ちょっとした刺激で気持ちや体調が変わる [易刺激性]
 - *周囲の人に暴言を吐く、暴力をふるう、物を壊す、敵意をもつ [攻撃性]
 - *実際にはないものが見えたり、聞こえたり、感じたりする [幻覚]
 - *根拠がないのに、あり得ないことを考えてしまう [妄想]
 - *軽い意識の混乱がみられる [せん妄]
 - *不安が強くなる
 - *死にたいという気持ちになる
- ご家族などの方は、服用中や服用後の患者さまの様子を観察し、変化がみられた場合には、医師にご連絡ください。お子さまや幻覚・妄想を生じる患者さまの場合は、ご自身で状態の変化に気づけないことがありますので、ご家族などが注意して観察してあげてください。

気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。